



# PENELOPE

*Prenor x INRA 74.3.21*



## VARIÉTÉ DE CONSOMMATION

- *Variété à chair jaune.*
- *Variété demi précoce avec une végétation vigoureuse.*
- *Gros tubercules très homogènes d'un excellent goût culinaire.*
- *Excellente en stockage longue durée.*

## PLANTE & TUBERCULE

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| EMERGENCE           | MOYENNE           |
| VIGUEUR PLANTE      | ELEVÉE            |
| COULEUR PEAU        | JAUNE FONCE       |
| COULEUR CHAIR       | JAUNE             |
| FORME DU TUBERCULE  | OBLONG ALLONGE    |
| REGULARITE DE FORME | BONNE             |
| YEUX                | TRES SUPERFICIELS |
| CALIBRE             | TRES GROS         |
| NOMBRE              | ASSEZ FAIBLE      |
| EMERGENCE           | MOYENNE           |

## MALADIES

|   |              |
|---|--------------|
| RESISTANCE MILDIOU TUBERCULE              | MOYENNE      |
| RESISTANCE GALE COMMUNE PUSTULE           | ASSEZ FAIBLE |
| RESISTANCE PVY                            | FAIBLE       |
| RESISTANCE PVY <sup>ntm</sup>             | ELEVÉE       |
| RESISTANCE <i>G.rostochiensis</i> (Ro1-4) | NULLE        |
| RESISTANCE <i>G.pallida</i> (Pa2-3)       | NULLE        |
| RESISTANCE GALLE VERRUQUEUSE pathovar 1   | NULLE        |
| RESISTANCE MILDIOU TUBERCULE              | MOYENNE      |

## QUALITE & UTILISATION

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| RENDEMENT                   | ELEVÉ           |
| TENEUR EN M.S.              | FAIBLE (15-17%) |
| GROUPE CULINAIRE            | A-B             |
| DELITEMENT APRES CUISSON    | ABSENT          |
| NOIRCISSEMENT APRES CUISSON | ABSENT          |
| CONSERVATION                | MOYENNE         |

## PHYSIOLOGIE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| REPOS VEGETATIF         | ASSEZ COURT |
| RESISTANCE A LA ROUILLE | MOYENNE     |
| RESISTANCE A L'EGERMAGE | FAIBLE      |